



MODELLO DI GESTIONE VITICOLA AVANZATA DEL SOAVE E DEI TERRITORI LIMITROFI





DIFESA ANTIPARASSITARIA 2023

Bollettino del 1º Agosto 2023 Nº 16















VITIGNI INTERESSATI: TUTTI ,<mark>Mantenere una adeguata copertura della Vegetazione con Rameici e Zolfo, e per TIGNOLETTA III° GENERAZIONE</mark>:

Prestare massima ATTENZIONE ai tempi di carenza dei diversi formulati commerciali!

(NB: L'inizio della raccolta per le varietà precoci è ipotizzata nell'ultima decade di Agosto) Tenendo conto che la terza generazione ha in genere uno sviluppo scalare nel tempo, si può ipotizzare di posizionare i diversi insetticidi come segue:

Sostanza Attiva	Intervallo di sicurezza	Momento di applicazione		Periodo consigliato	
				pianura,	Collina e
				fondovalle	alta collina
Metossifenozide	14 gg max 1 tratt / annuo	deposizione uova		02-05 agosto	05-08 agosto
Tebufenozide	30 gg				
Clorantraniliprole	30 gg				
Bacillus thuringensis	_				
1° tratt					
Emamectina b.	7 gg	uova testa nera		05-08	08-11
Spinetoram	7 gg (max 1 applicaz. /anno)			agosto	agosto
Spinosad 1° tratt	15 gg				
Bacillus thuringensis 2° tratt	-				
Piretroidi	vari	larve		11-14 agosto	14-17 agosto
Spinosad 2° tratt	15 gg				

- BOTRITE: PER TUTTE LE VARIETA', si consiglia di utilizzare prodotti ANTIBOTRITICI biologici e terpeni,

Prestare massima attenzione all'andamento meteo, evitare di trattare prima di eventuali piogge per limitare il dilavamento dell'Insetticida e Antibotritico

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578 DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00