



MODELLO DI GESTIONE VITICOLA AVANZATA DEL SOAVE E DEI TERRITORI LIMITROFI





DIFESA ANTIPARASSITARIA 2025

Bollettino n° 12 del 24 giugno 2025















Vitigni interessati	TUTTI
Trattamento	Prima di eventuali piogge
Oidio	FASE PARTICOLARMENTE SENSIBILE, ZOLFI bagnabili / liquidi, o Molecole specifiche, in funzione della strategia adottata
Peronospora	Copertura / rameici associati a cerodinamici per varietà precoci
Tignoletta	Il numero delle catture è molto variabile ma in alcune zone di pianura sono
	state rilevate le prime larve di <mark>Tignoletta, dal 25 giugno al 30 giugno si</mark>
	consiglia di posizionare il trattamento con Emamectina Benzoato o Bacillus T.,
	nel caso l'azienda decida di procedere con un intervento di ribattuta si
	consiglia di aspettare 12/14 giorni da precedente.
Flavescenza Dorata	LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA:
	In base al monitoraggio regionale la seconda data di intervento definita
	dall'UO Fitosanitario va <u>eseguito a distanza di almeno 10gg dal primo</u>
	<u>intervento, rispettando la forbice regionale dal 20 giugno al 4 luglio 2025</u> .
	NB: Il trattamento deve essere Prodotti consigliati: Deltametrina,
	Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina o Tau-Fluvalinate.
	ATTENZIONE: dai recenti monitoraggi si riscontrano le prime piante colpite
	da Flavescenza, AVERE CURA DI ESTIRPARE LE VITI SINTOMATICHE
Nota Agronomica	Irrigazione: dove è possibile si consiglia di irrigare, vista la fase di
	moltiplicazione cellulare.
	Avere cura di eseguire <u>cimature</u> frequenti e non troppo invasive, e per Avere cura di eseguire <u>cimature</u> per suitare tutto ciò si considire di
	evitare problemi di scottature, per evitare tutto ciò, si consiglia di
	intervenire con prodotti a base di caolino.

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00